

Innovative Hygiene.



3D animacija stupasnih bakterija

Priručnik za dezinfekciju

Osnove ispravne dezinfekcije.

srb



SADRŽAJ

Predgovor	3
Osnovni pojmovi	4
Tabela doziranja	8
Evropska uredba o biocidima	8
Test kopije/Mikrobiološka ispitivanja okoline	10
Mikroorganizmi	10
Bakterije	
Otporni mikroorganizmi/bakterije	
Često prisutne bakterije u području njegе	
Virusi	14
Umotani virusi	
Neumotani virusi	
Izveštaji načina delovanja protiv virusa	
Načini prenosa virusa	
Često prisutni virusi u području nege	
Paraziti	17
Spisak preporučenih pomoćnih i sredstava za negu	17
Smernice za higijenu	18
Standardne osnovne mere higijene	
Izvori zaprljanja	
Modeli izolacije	
Komunikacija prilikom premeštanja	
E. Coli, ESBL	23
MRSA	24
VRE	25
Clostridium difficile	25
Novovirus	25
Influenca	26
Tuberkuloza	26
Objašnjenja pojmova	foldout
O proizvodu - sastav	ulagač

HAGLEITNER – VAŠ PARTNER ZA PROFESIONALNU DEZINFEKCIJU

Higijena zahteva znanje – tek tada deluje sigurno i pouzdano. HAGLEITNER obuhvata ovo znanje od 1971. Pri tome ne trebamo biti izolirani, mnogo više ljudi treba umati ideo: Ljudi poput Vas. Jer higijena deluje najbolje zajednički. Ovdje HAGLEITNER želi postaviti temelj.

Vaš Hans Georg Hagleitner



Hans Georg Hagleitner
Generalni direktor

HAGLEITNER akademija – INOVACIJE TREBAJU OBRAZOVANJE

HAGLEITNER zna: Inovativna higijena zahteva temeljno obrazovanje i kontinuirano usavršavanje HAGLEITNER saradnika. Zbog toga HAGLEITNER svoje uposlenike školuje na svojoj akademiji.

Jer znanje je tu da se deli, zbog toga HAGLEITNER akademiju nudi i školovanja za svoje partnere i kupce. Jer i za ovo su redovna školovanja uposlenih važan segment kako bi se osigurao higijenski i ispravan rad. Dobro obučeno osoblje omogućava uštede u području ispravnog doziranja hemikalija i dužem životnom veku mašina i manjem opterećenju okoliša.

Iskoristite i Vi naš desetlječni Know-how! Naši kursevi na teme kao „higijena rublje i odstranjivanje mrlja“, „zaštita ruku i kože“ ili „uspešno održavanje prostora“ vode dokazani eksperti iz ovih oblasti. Također, rado ćemo ponuditi i školovanja individualno prilagođena Vašim potrebama.

Kontaktirajte svog partner kod HAGLEITNER-a i informirajte se o našim ponudama školovanja na <http://academy.hagleitner.com> Radujemo Vam se!



OSNOVNI POJMOVI

Za početak Vam želimo približiti nekoliko osnovnih pojmljiva.

Higijena

Higijena je učenje prevencije bolesti i održavanja, promovisanja i jačanja zdravlja.

Čišćenje

Pod čišćenjem se podrazumeva mehaničko otklanjanje neželjenih zaprljanja, ostataka ili tragova na površini. Prljavština i proteini su osnov za život mikroorganizama. Ispravno čišćenje je osnova za sigurnu dezinfekciju.

Dezinfekcija

Pod dezinfekcijom podrazumevamo ubijanje ili deaktiviranje mikroorganizama, tako da se stavljuju u stanju u kojem ne mogu biti zarazni. Svakoj dezinfekciji mora prethoditi temeljno čišćenje. Uslov za efektну dezinfekciju je optička čistoća površine koja se treba dezinficirati. O dezinfekciji govorimo kada je faktor redukcije klica najmanje 10^{-5} . To znači, od izvorno 1.000.000 jedinica koje formiraju koloniju (KBE) ne smeju preživeti više od 10 KBE. To odgovara 99,999% Kod rublja je faktor redukcije čak 10^{-7} .

Dezinficirajuće čišćenje

Usklađene supstance omogućavaju da se s jednim kombinovanim proizvodom može i očistiti i dezinficirati. Ukoliko površina koju treba očistiti nije ekstremno kontaminirana ili zaprljana, dovoljno je jedno nanošenje. U suprotnom se ovi pruzovi koriste u dva nanošenja. Zato što brisanje vodom između nanošenja nije potrebno, ovi proizvodi u praksi postaju sve omiljeniji.

Sterilizacija

Pod sterilizacijom se podrazumeva proces kojim se materijali i predmeti oslobođaju živih mikroorganizama, posebno i u njihovim mirujućim stanjima, npr. spore odnosno ovi se mikroorganizmi ubijaju ili deaktiviraju tako da ne mogu izazvati stanja bolesti. Kod sterilizacije je reduksijski faktor je najmanje deset puta veći nego kod dezinfekcije.

Time postignuto stanje materijala i predmeta označavamo sterilnim odnosno steriliziranim.

Higijena ruku

Mere higijene ruku pripadaju najvažnijim merama preventive infekcija i sadrže:

- Plan za zaštitu kože
- Zaštita kože
- Čišćenje kože
- Sušenje ruku
- Dezinfekcija
- Njega kože

Bakterijska flora kože se sastoji od rezidentnim i transrezidentnih flora.

Rezidentna flora (mesna flora):

Je fiziološka nastamba kože (normalna flora kože). Sastav i broj klica je relativno konstantan. I ovi mikroorganizmi mogu ukoliko promene mesto i dođu na pogrešno dovesti do infekcija, npr zapaljenja kože oko nokta.

Transrezidentna flora (pristupna flora):

Ona se sastoji od promenljivih klica, koje se većinom privremeno nastanjuju iz okoline ili sa površina. Indikacije za pranje ruku:

- Početak i kraj rada:
- Pre i posle pauza
- Kod vidnih zaprljanja
- Nakon korištenja toaleta

Da bi se očuvao kiseli sloj kože, potrebno je obratiti pažnju na sledeće:

- Pranje samo hladnom do mlakom vodom
- Ne prati predugo
- Ne koristiti četke za nokte
- Sapun temeljito isprati
- Ruke potpuno osušiti jednokratnim papirom
- Na kraju provesti dezinfekciju ruku
- Koristiti handCREAM PURE

Indikacije za higijensku dezinfekciju ruku:

- Pre aseptičkih radnji
- Pre kontakta sa pacijentima ili stanovnicima
- Pre oblačenja radne odeće
- Nakon kontakta sa pacijentima odnosno stanovnicima ili njihove direktnе okoline
- Nakon prljavih radnji
- Nakon promene rukavica
- Nakon kontakta sa potencijalno infektivnim materijalima

Higijenska dezinfekcija ruku obično se vrši alkoholnim dezinfekcijskim sredstvom metodom utrjavavanja od 30 sekundi (eventualno 60 sekundi) bez dodavanja vode. To je najsigurnija i najbrža mera kako bi se izbegao prenos potencijalnih izazivača bolesti.

U područjima gde se ne smeju koristiti alkoholni proizvodi, preporučujemo septDES FOAM za higijensku dezinfekciju ruku sa vremenom upijanja od 60 sekundi.



Higijenska dezinfekcija ruku se može provesti uvek na čistim rukama. Prethodno pranje je neophodno, kada ruke nisu kontaminirane odnosno nisu čiste.

Proizvodi namenjeni higijenskoj dezinfekciji ruku su: septLIQUID SENSITIVE, septDES GEL, septLIQUID PLUS, septDES FOAM

Higijensko pranje ruku:

Kod higijenskog pranja ruku se proizvodi utrjava 2 puta po 30 sekundi na suve ruke. Nakon toga se ispere vodom. Ruke je potrebno potpuno osušiti jednokratnim papirom.

Ovde se radi također o dezinfekcijskoj mjeri, ali nije tako delotvorna kao higijenska dezinfekcija ruku. Ova mera se preporučuje u toaletu ali nije dovoljna za higijensku dezinfekciju ruku npr u kuhinji

Proizvodi namenjeni za higijensko pranje ruku: septDES FOAM, septDES FOAM SOAP

Priprema rublja:

Ranije se posebno rublje, kao na primer: zavoji, gaze, donje rublje pacijenata, posteljina kao i mopovi i krpe za brisanje u oblasti zdravstva dezinficiralo otkuvavanjem na temperaturi od 95 °C. Mere štednje (električne energije, vremena, vode) i osetljiva vlakna su dovela do toga da se rublje uz hemijske dodatke koji sadrže dezinfekcijske komponente, može dezinficirati da a se pri tome i uštedi. Posebno preporučljivo je dezinficirajuće pranje kuhinjske odeće, rublja i krpa za čišćenje u oblasti zdravstva i wellnessa.

Proizvodi namenjeni dezinfekciji rublja su: havon T7 u havon PROFESSIONAL DISINFECT 40 i 60, havon DES 40, havon DES 60, havon PERFECT

Priprema posuđa:

Mikroorganizmi se ubijaju tek pri temperaturi većoj od 70 °C. To znači da temperatura na posudu mora dostići ovu temperaturu. Uslovi temperaturne dezinfekcije u higijeni posuđa su zadovoljeni ukoliko se temperature iz tabele mogu izmeriti na sljedećim područjima. Linija vodilja za zajednice zahteva merenje na posudu od 80 °C 30 sekundi odnosno 85 °C 10 sekundi. Ukoliko ove temperature ne budu dostignute na posudu ili ukoliko postoji povećana opasnost od infekcije potrebno je provesti hemijsko-termičku dezinfekciju. To znači da je potrebno dozirati proizvod koji sadrži dezinfekcijske komponente.

Proizvodi namenjeni za dezinfekciju posuđa: ecosol DES TABS, ecosol ECO DES, ecosol CLEAN DES

Temperature na posudu

	DIN 10510 Višestruki spremnik	DIN 10511 Čaše	DIN 10512 Jednostruki spremnik
Vreme pranja	2 min	90 sekundi	90 sekundi
Temperatura prepranja	40-50°C		
Temperatura čišćenja	60-65°C	55-60°C	60-65°C
Temperatura ispiranja	60-70°C		
Temperatura sušenja	80-85°C	65° +/- 2°C	80-85°C

Dezinfekcija površina:

Dezinfeksijska sredstva za površine deluju samo na prethodno očišćenoj površini. Posebno, zaprljanja od belančevina i masnoća se moraju temeljito otkloniti pomoću namenskog sredstva. Također je za optimalni rezultat dezinfekcije važno da je površina koja se dezinficira suva.

Važno je obratiti pažnju na koncentraciju primene i vreme delovanja. Kod brzo delujućih dezinfekcijskih sredstava na bazi alkohola, površina mora celo vreme delovanja biti vlažna.

Kod dezinfekcijskih sredstava na QUATS bazi nije potrebno površinu održavati vlažnom za vreme delovanja. Ovi proizvodi se upiju u površinu i deluju i naknadno.

Primer: Za hygienic3000 je propisana koncentracija od 2,5% sa vremenom delovanja od 15 minuta. To znači da površina ne mora biti vlažna 15 minuta ali proizvodu jeste potrebno toliko da ubije mikroorganizme ili ih deaktivira. Tek nakon 15 minuta je moguće ponovo koristiti površinu.

Kod kombinovanih proizvoda, čišćenje i dezinfekcija se rade u jednom koraku. Ovi proizvodi se, s izuzetkom podova, moraju odstraniti nakon vremena delovanja kako bi se zaprljanja otklonila.

Ukoliko se proizvod ne razređuje putem dozirnih sistema kao easy 2MIX ili integral 2GO, tabela pomaže kod ispravnog razređivanja.

Proizvodi namenjeni dezinfekciji površina: hygienicDES PERFECT, hygienic3000, hygienicDES AC, hygienicPLUS, hygienicDES FORTE, hygienicDES 2GO, sanitaryDES 2GO, wcDISINFECT, hup DISINFECT, hygienicDES CAPS

Tabela doziranja je na upit na raspolaganju kao i u našem webshopu.



Innovative Hygiene.

TABELA DOZIRANJA

ZA RASTVORE ZA DEZINFKECIJU

VODA KONCENTRAT

Odnos mešavine Litara rastvora	0,25%		0,5%		1%		1,5%		2%	
1l	997,5ml	2,5ml	995,0ml	5ml	990,0ml	10ml	985,0ml	15ml	980,0ml	20ml
2l	1995,0ml	5ml	1990,0ml	10ml	1980,0ml	20ml	1970,0ml	30ml	1960,0ml	40ml
3l	2992,0ml	8ml	2985,0ml	15ml	2970,0ml	30ml	2955,0ml	45ml	2940,0ml	60ml
4l	3990,0ml	10ml	3980,0ml	20ml	3960,0ml	40ml	3940,0ml	60ml	3920,0ml	80ml
5l	4987,5ml	12,5ml	4975,0ml	25ml	4950,0ml	50ml	4925,0ml	75ml	4900,0ml	100ml
8l	7980,0ml	20ml	7960,0ml	40ml	7920,0ml	80ml	7880,0ml	120ml	7840,0ml	160ml
10l	9975,0ml	25ml	9950,0ml	50ml	9900,0ml	100ml	9850,0ml	150ml	9800,0ml	200ml
20l	19950,0ml	50ml	19900,0ml	100ml	19800,0ml	200ml	19700,0ml	300ml	19600,0ml	400ml
30l	29925,0ml	75ml	29850,0ml	150ml	29700,0ml	300ml	29550,0ml	450ml	29400,0ml	600ml
Odnos mešavine Litara rastvora	2,5%		4%		5%		7%		7,5%	
1l	975,0ml	25ml	960,0ml	40ml	950,0ml	50ml	930,0ml	70ml	925,0ml	75ml
2l	1950,0ml	50ml	1920,0ml	80ml	1900,0ml	100ml	1880,0ml	140ml	1850,0ml	150ml
3l	2925,0ml	75ml	2880,0ml	120ml	2850,0ml	150ml	2790,0ml	210ml	2775,0ml	225ml
4l	3900,0ml	100ml	3840,0ml	160ml	3800,0ml	200ml	3720,0ml	280ml	3700,0ml	300ml
5l	4875,0ml	125ml	4800,0ml	200ml	4750,0ml	250ml	4650,0ml	350ml	4625,0ml	375ml
8l	7800,0ml	200ml	7680,0ml	320ml	7600,0ml	400ml	7440,0ml	560ml	7400,0ml	600ml
10l	9750,0ml	250ml	9600,0ml	400ml	9500,0ml	500ml	9300,0ml	700ml	9250,0ml	750ml
20l	19500,0ml	500ml	19200,0ml	800ml	19000,0ml	1000ml	18600,0ml	1400ml	18500,0ml	1500ml
30l	29250,0ml	750 ml	28800,0ml	1200ml	28500,0ml	1500ml	27900,0ml	2100ml	27750,0ml	2250ml

www.hagleinr.com

EVROPSKA UREDBA O BIOCIDIMA

Dezinfečijska sredstva sadrže biocidne supstance. Mogu biti štetne za okoliš. Za zaštitu ljudi i okoliša, Evropska Unija je donela uredbu koja reguliše distribuciju dezinfekcijskih proizvoda i njihovih supstanci.

Uredba o biocidima 528/2012 ili BPR (Biocidal Products Regulation) zahteva da proizvođači sirovina ocenjuju supstance biocidnih proizvoda. Ukoliko supstanca bude dozvoljena za upotrebu u dezinfekcijskom sredstvu, moguće ju je onda koristiti u istim. Da bi proizvod sa dozvoljenim supstancama mogao izaći na tržište, proizvođač takođe mora oceniti proizvod. Jedan od kriterija ispitivanja je i delovanje proizvoda prema predviđenim EN normama.

EN norme

Iako je ranije bilo dovoljno da proizvod zadovoljava kriterije VAH/ÖGHMP ili RKI, zbog BPR je neophodno da zadovolji i najnovije EN norme pre izlaska na tržište. Ubuduće će norme igrati odlučujuću ulogu kod ispitivanja delovanja.

Da bi se bolje razumelo, sledi lista koja norma za koje delovanje je značajna u našem segmentu.

Dezinfekcija površina		
Područje delovanja	Norma ispitivanja	Titula
Baktricid	EN 13727	Kvantitativni pokušaj suspenzije za određivanje baktericidnog delovanja u oblasti ljudske medicine
Baktricid Levurocid Fungicid	EN 13697	Kvantitativni test površina kod neporoznih površina za određivanje baktricidnog ili fungicidnog delovanja hemijskog dezinfekcijskog sredstva u području ishrane, industrije, domaćinstva i javnih uređenja.
Baktricid Levurozid	EN 16615	Kvantitativni test za određivanje baktericidnog i levurocidnog delovanja na neporoznim površinama sa mehaničkim delovanjem uz pomoć krpa u području ljudske medicine
Tuberkulocid Fungicid	EN 13624	Kvantitativni test suspenzije za ispitivanje levurocidnog ili fungicidnog delovanja u području ljudske medicine.
Mikobactericid Levurocid	EN 14348	Kvantitativni test suspenzije za određivanje mikobakterijskog/tuberkoloidnog delovanja hemijskog dezinfekcijskog sredstva u području ljudske medicine uključujući i dezinfekciju instrumenata
Sporocid	EN 13704	Kvantitativni test suspenzije za određivanje sporicidnog delovanja hemijskogdezinfekcijskog sredstva u području ishrane, industrije, domaćinstva i javnih uređenja
Sporocid	EN 17126	Kvantitativni test suspenzije za određivanje sporicidnog delovanja hemijskogdezinfekcijskog sredstva u području ljudske medicine
Ograničeni virucid	EN 14476	Hemijsko dezinfekcijsko sredstvo i antiseptik - Kvantitativni test suspenzije za određivanje virucidnog delovanja u području ljudske medicine

Izveštaji se predaju **ÖGHMP** (Österr. Gesellschaft für Hygiene Mikrobiologie und Präventivmedizin), **VAH** (Verbund für angewandte Hygiene), ranije **DGHM** (deutsche Gesellschaft für Hygiene und Medizin). Ukoliko navedeni instituti prihvate izveštaje, proizvod dobija certifikat sa potvrdom delovanja.

Prilikom pravljenja izveštaja se testiraju određene testne klice. Izabrane su tako, da se može smatrati da proizvod koji deluje na te mikroorganizme, će i delovati na ostale bakterije izuzev tuberkulozne i bakterija koje proizvode spore npr Clostridium difficile.

Dezinfekcija ruku		
Područje delovanja	Norma ispitivanja	Titula
Baktricid	EN 1499	Higijensko pranje ruku
	EN 1500	Higijenska dezinfekcija ruku
	EN 12791	Hirurško sredstvo za dezinfekciju ruku



TEST KOPIJE/ MIKROBIOLOŠKA ISPITIVANJA OKOLINE

Da bi se dokazala efikasna dezinfekcija ruku i površina moguće je provesti mikrobiološko ispitivanje okoline putem testa kopije. Za ovo naša kompanija nudi pakete testiranja čišćenja i dezinfekcije u području kuhinje, rublja i okoliša koji se mogu naručiti.

MIKROORGANIZMI

Bakterije:

Bakterije postoje od jedne jedine ćelije bez jezgre i mikroskopski su male. Prave najjednostavniji životni oblik na našoj planeti i nalaze se svugde (zrak, zemlja, voda). Bakterije su jednoćelijske. Iako žive u grupama, to nisu prave zajednice koje njeguju izmenu supstanci.

Povoljni uslovi života su vlaga, toploća i dobar izvor hrane (vlažne krpe za čišćenje, vlažna područja, neohlađena jela). Tu se najbolje razmnožavaju putem diobe ćelija. Pri povoljnim uslovima, u roku od 17 sati od jedne bakterije nastane 17 milijardi bakterija. Cilj dezinfekcije jeste zaustaviti ovo razmnožavanje.

Tri osnovna oblika klasičnih bakterija su stupasti bacili, okrugle koke i uvijene do spiralne spirile.

Otporni mikroorganizmi/bakterije:

Pod otpornim klicama podrazumevamo bakterije koje su otporne (neosetljive) na određene antibiotike.

Sva ispravno primenjena dezinfekcijska sredstva deluju na otporne klice. Periodična izmena dezinfekcijskih sredstava zbog toga i nema smisla.

Primeri rezistentnih bakterija su:

- MRSA (Methicillin resistenter Staphylococcus aureus),
- ESBL (Extended-Spectrum-Betalaktamasen),
- EHEC (Enterohämorrhagische Escherichia coli),
- VRE (Vancomycinresistenten Enterokokken),
- MRGN

3 ili 4 (Multi resistantni gram negativne klice, koji je otporan na 3 ili 4 grupe antibiotika)



Otporni mikroorganizmi

MRGN – Multi Resistant Gram Negativ

Povećanjem otpornih klica kao i zbog dodatnih procena opasnosti, otporne klice se klasificiraju prema tome koliko grupa antibiotika deluje na njih. Ukoliko je klica označena kao 3 MRGN (Multi Resistant Gram Negativ) samo jedna grupa antibiotika deluje na njega. Ukoliko su bakterije otporne na sve grupe antibiotika, govorimo o 4 MRGN.

Često prisutne bakterije u području njege:

Escherichia Coli (E. coli) – antibiotski otporan oblik ESBL

E.coli je stupastog oblika i važan dio crevne flore. Izvan creva E.coli može izazvati bakterijske infekcije npr: Infekcije mokraćnih puteva ukoliko dospe u mehur ili zapaljenja trbušne maramice ili moždane ovojnica kod novorođenčadi (infekcije prilikom poroda).



Escherichia Coli

Enterococcus faecium – oblik otporan na antibiotike je VRE

Enterokoke su okruglog oblika koje imaju važnu ulogu u probavi. Prilikomunosa antibiotika se mogu razmnožiti i izazvati probleme. Potogena stabla mogu uzrokovati teške nosokomialne infekcije kod osoba oslabljenog imunološkog sistema.



Enterococcus faecium

Sredstva namenjena za dezinfekciju: Sva sredstva za dezinfekciju

Staphylococcus aureus - Oblik otporan na antibiotike je MRSA

Staphylococcus aureus je bakterija kuglastog oblika koja je uglavnom grupisana. Kod mnogih ljudi se nalazi na koži i u gornjim disajnim putevima i često ne izaziva nikakve simptome bolesti. Ukoliko pak zbog nepovoljnih životnih uslova ili zbog oslabljenog imunološkog sistema klica dobije priliku da se razmnoži može doći do infekcije kože a u telu do životno opasnih obolenja kao upale pluća, šok sindroma ili trovanja krvi. 9 od 10 pacijenata ili osoba pod negom su nosioci ali ne i inficirani.




Staphylococcus aureus

U kuhinji, koagulase-pozitivni stafilocok igraju značajnu ulogu kao trovači hrane. Ukoliko Staphylococcus aureus npr putem male rane na prstu dospe u hranu i ima vremena za razmnožavanje (bez hlađenja), prilikom zagrijavanja proizvodi otrov koji izaziva teške slučajeve povraćanja.

Sredstva namenjena za dezinfekciju: Sva sredstva za dezinfekciju

Pseudomas aeruginosa

Pseudomas su stupaste aktivne bakterije. Posebno su otporne na okolišne faktore. Radi se o vlažnoj klici koja je u stanju formirati sluz koja je štiti od antibiotika i dezinfekcijskih sredstava. Iako bakterije ove vrste kod ljudi sa jakim imunološkim sistemom retko izazivaju bolesti, kod ljudi sa oslabljenim imunitetom mogu izazvati infekcije rana, dišnih puteva, upalu pluća, trovanje krvi i obolenja srca.



Pseudomas aeruginosa

Posebnu pažnju je potrebno obratiti na vase sa cvećem, inhalatore i ovlaživače prostora. Ukoliko se Pseudomas aeruginosa nađu u vodovodnim cevima, naprave sluzavi sloj i tako kontinuirano kontaminiraju vodu. Sredstva za dezinfekciju površina ne mogu otopiti ovaj sloj u instalacijama i ovde je potreban poseban proces.

Sredstva namenjena za dezinfekciju: Sva sredstva za dezinfekciju



Legionele

Legionele su stupaste bakterije. Pojavljuju se tamo gde zagrijana voda pruža optimalne uslove za razmnožavanje. Npr.

- Cevi za topalu vodu
- Bazeni
- Filteri zraka u klima uređajima
- Ovlaživači zraka
- Školski tuševi i ostali javni tuševi
- Kade, bazeni sa stajaćom vodom
- Instalacije
- Rezervoari za vodu



Legionele

Prenos legionela je u principu moguć i putem kontakta sa vodom. Mikroorganizmi moraju kroz dišne puteve dospeti duboko u područja pluća. Ne izaziva svaki kontakt sa zaraženom vodom opasnost za zdravlje. Tek udisanje zaražene vode (aerosola) može dovesti do obolenja. Pijenje zaražene vode osobama sa jakim imunološkim sistemom ne predstavlja nikakvu opasnost.

Sanacija zaraženih instalacija se može uraditi hemijskim ili termičkim putem.

[Za to Hagleitner ne nudi nikakve proizvode.](#)

Clostridium difficile - Clostridini

Clostridium difficile je bakterija stupastog oblika koja se nalazi u crevima i koja se razmnožava kada zbog upotrebe antibiotika odumiru druge bakterije. U nastalim prazninama se Clostridium difficile može ekstremno brzo razmnožavati. Bakterija proizvodi otrove koji uništavaju ćelije creva i izaziva dijareju. Zaraza nastaje fekalno-oralno (kontaminiranim rukama do telesnih otvora) i slaba higijena je ubrzava. Infekcija je česta kod starijih i bolesnih ljudi i najčešća je nosokomijalna infekcija.



Klostridine

Posebno paziti: U kontaktu sa osobama koje boluju od CD-a, nositi rukavice a nakon skidanja istih, ruke dezinficirati kako bi se ubile vegetativne Clostridium bakterije nakon čega je još potrebno oprati ruke 2x sapunom kako bi se otklonile spore.

[Sredstva namenjena za dezinfekciju spora: hygienicDES CAPS, svi dezinfekcijski deterdženti za rublje](#)

Tuberkoloza

Tuberkoloza je svetski raširena bakterijska infekcijska bolest koju izazivaju različite vrste mikobakterija i kod ljudi najčešće napada pluća. Vodeća je u svetskoj statistici infekcijskih bolesti sa smrtnim ishodom. 2018 je od tuberkoloze umrlo preko 1,5 miliona ljudi. TB se prenosi kapljicama (smeh, govor, kašalj, kijanje) ali i preko ruku, kože i površina.

[Sredstva namenjena za dezinfekciju: hygienicDES PERFECT, hygienicDES CAPS, hygienicDES AC, hygienicDES FORTE, hup DISINFECT, septLIQUID SENSITIVE, septLIQUID PLUS, septDES GEL](#)




Tuberkoloza

Salmonela

Salmonela pripada stupastim bakterijama. Izaziva kod ljudi teške slučaje povraćanja. Prenosi se s osobe na osobu ali je moguć i prenos sa životinja na ljudi. Retka je infekcija putem hrane (jaja, perad). Salmonela može sedmicama preživeti izvan ljudskog odnosno životinjskog tela. Pod utecajem topote od 55 °C salmonela umire nakon sat vremena a na 60 °C nakon pola sata. Kako bi se zaštitilo od infekcije salmonelom preporučuje se zagrijavanje namirnica najmanje 10 minuta na 75 °C. Zamrzavanjem se bakterije ne ubijaju.

[Sredstva namenjena za dezinfekciju: Sva sredstva za dezinfekciju](#)



Salmonela

Campylobacter

Campylobacter je vrsta spiralne bakterije i često se kroz namirnice (svinjsko meso, perad) unosi u kuhinju. Posebno obratiti pažnju na izbegavanje unakrsne kontaminacije (perad – salata). Zbog toga higijena u kuhinji mora biti na visokom nivou.

Kod ljudi Campylobacter izaziva dijareju i zapaljenja. Campylobacter su zu salmonelu najčešći uzročnici dijareje. Zamrzavanjem namirnica se Campylobacter može ubiti.

[Sredstva namenjena za dezinfekciju: Sva sredstva za dezinfekciju](#)




Kampilobakter

Listerije

Listerije su nezahtevne na hladnoću otporne stupaste bakterije sa mogućnosti razmnožavanja i u najnepovoljnijim uslovima. Često se javljaju u sirovom crvenom mesu, ribi i sirovom melku. Imaju i mogućnost razmnožavanja u vakumiranim namirnicama. Stariji ljudi, trudnice i osobe sa slabim imunitetom bi trebali izbegavati hladno dimljenu ribu, sirovo mleko i sveži sir. I kod kuhanje šunke je moguća infekcija listerijom koja može dovesti do upale moždane ovojnica i trovanja krvi.


[Sredstva namenjena za dezinfekciju: Sva sredstva za dezinfekciju](#)



Listerije



VIRUSI


Virusi su infektivne čestice još manje od bakterija. Za razliku od bakterija, virusi nisu samostalni živi organizmi i ne poseduju sopstveni metabolizam. Kako bi se razmnožavali, moraju zauzeti tuđu ćeliju. Pri tome, tu ćeliju programiraju tako da zaboravi svoj zadatak i nastavlja proizvoditi samo virus. Virusi u zemlji, tečnosti ali i zraku su jako slični bakterijama. Primer virusnih oboljenja: Gripa, herpes, HIV/Aids, norovirusi

Razlikujemo dve vrste virusa:

Umotani virusi

Umotani virusi nisu toliko otporni odnosno osetljivije reaguju na sva dezinfekcijska sredstva u odnosu na neumotane virusе.

Primeri umotanih virusa: Influenca (gripa), HIV (AIDS), HBV (Hepatitis B), HCV (Hepatitis C), vakcinija (pljuskavice), BVDV (životinjska kuga). Ukoliko se dezinfekcijski proizvod ograniči, deluje na sve umotane virusе.

Neumotani virusi

Neumotani virusi reaguju na utecaje okoline i jako su otporni na dezinfekcijska sredstva. Mogu preživeti na površinama kao što su tekstil ili duboko smrznute namirnice nekoliko sedmica. Dezinfekcijska sredstva moraju sadržavati visoki udio etanola (alkohola) ili posebne aktivne supstance (adelide, perokside).

Primer za neumotane virusе: Norovirusi, rotavirusi, polioma-SV40 (uzrokuje rak grlića maternice), polio (dečja paraliza) adeno, hepatitis A (žutica)

Izveštaji načina delovanja protiv virusa

Ograničen virucid

Ograničen virucid se testira u skladu sa RKI (Robert Koch Institut) u proizvodu na BVDV (Bovine Diarrhoe Virus – životinjski virus dijareje) i vakcinia virus (umotani virus pljuskavica). Ukoliko proizvod deluje na ove virusе, deluje i na sve umotane virusе.

Ograničen virucid PLUS

Nakon norovirusa, rotavirusa, adenovirusa koji pretstavljaju najčešće uzročnike viralnih infekcija i jednostavniji su za eliminaciju od polio virusa, uvedeno i dodatno područje delovanja sa ograničenim virucidom PLUS. To znači da ako je proizvod za ograničen virucid, onda deluje i na umotane virusе kao adeno, rota i norovirus.

Virucid

Ukoliko proizvod deluje na polio, adeno, polioma i noroviruse, onda deluje i na sve motane i neumotane virusе.

Ovi izveštaji se ne moraju nužno podnositi VAH/ÖGHMP, budуći da se efikasnost virusa ne uzima u obzir u tim kompanijama.


Načini prenosa virusa

Kao i bakterije, virusi se mogu prenosi rukama i putem telesnih otvora. Zbog svoje veličine su virusi lakoprenosivi. Virusi se jednostavno mogu preneti i putem rublje (osušena krv na rublju).

Nasuprot bakterijama, moguće se cepiti protiv mnogobrojnih virusnih oboljenja. Test kopije kao kod bakterija za dokaz prisustva virusa nije moguć. Ispravne i kontinuirane mere dezinfekcije (temeljne mere higijene) ruku i površina su time još važnije.


Često prisutni virusi u području nege:

Norovirusi (neumotan)


Ovaj virus se često pojavljuje zimi (oktobar – april) i jako je lako prenosiv. Da bi se dobila infekcija norovirusom, potrebna je jako mala količina virusa. Simptomi oboljenja mogu biti jako povraćanje, dijareja, bolovi u glavi i zglobovima kao i opšta nemoć. Norovirusi pokazuju veliku otpornost prema dezinfekcijskim sredstvima što znači da dezinfekcijsko sredstvo mora imati virucidno dejstvo. Glavni način prenošenja je kožno-fekalni. Pogodjena osoba ostaje do 48 sati nakon poslednjeg simptoma zarazna. U slučaju dijareje na snazi je absolutna zabrana rada u područjima prerade hrane.

Sredstva namenjena za dezinfekciju: septLIQUID SENSITIVE (1 min EWZ), septLIQUID PLUS, septDES GEL, ecosolDES TABS, havon T7, havon DES 40, havon DES 60, hygienicDES FORTE, hup DISINFECT, hygienicDES AC, hygienicDES CAPS

HIV (umotan)


Virus humane dezificencije najčešće skraćen kao HIV, se označava kao Virus slabosti imuniteta. Zaraza dovodi do duge čak višegodišnje inkubacije AIDS-a, trenutno neizlječive bolesti imunološkog sistema. HI virus se prenosi kontaktom tjelesnih tekućina kao krv, sperma, vaginalni sekret kao i majčino mleko. Uobičajeni svakodnevni kontakt nije način prenošenja i ne predstavlja nikakvu opasnost od zaraze.

Sredstva namenjena za dezinfekciju: Sva sredstva za dezinfekciju,
Osim dezinfekcije posuđa i havon PERFECT-a



Hepatitis A (neumotan)

Hepatitis A infekcija je bolest izazvana Hepatitis A virusom (žutica). Glavni simptom je akutna upala jetre. Hepatitis A nije nikad hroničan i najčešće zaceluje spontano bez komplikacija. Prenosi se putem zaražene vode ili namirnica (npr školjki) i javlja se kao uvezena bolest nakon boravka u rizičnim područjima (bolest putovanja). Vakcinacija je trenutno najbolja zaštita protiv Hepatitis A infekcije.

Sredstva namenjena za dezinfekciju: septLIQUID PLUS, septDES GEL, havon T7, havon DES 40, havon DES 60, hygienicDES AC, hygienicDES CAPS




Hepatitis A virusi

Hepatitis B i C (umotani)

Hepatitis B je infekcijska bolest jetre, koja često (oko 90 %) prolazi akutno ponekad i hronično. Hepatitis B i C se prenose krvnim putem. Sa oko 350 miliona inficiranih ljudi je hepatitis B širom sveta najčešća virusna infekcija. Terapija hroničnog hepatitisa B je teška, zato je preventivna vakcinacija najvažnija mera za izbegavanje infekcije.

Hepatitis C je infektivna bolest izazvana Hepatitis C virusom kod ljudi. Prenosi se putem krvi, terapija je ovisno o genotipu moguća u ograničavajućem obliku. Trenutno ne postoji preventivna vakcinacija.

Sredstva namenjena za dezinfekciju: Sva sredstva za dezinfekciju, Osim dezinfekcije posuđa i havon PERFECT




Hepatitis B virusi

Influenca – gripa (umotana)

Prenosi se putem zraka ili kada sekret (šmrcanje) dođe u kontakt s kožom putem npr korištene papirne maramice. Najčešći simptomi su:

- Iznenadni početak bolesti
- Raširen osećaj bolesti u celom telu
- Visoka temperatura do 40 stepeni
- Drhtavica
- Glavobolja i umor
- Bolovi u udovima
- Suvi kašalj
- Gubitak apetita, mučnina i povraćanje



Influenca

Sredstva namenjena za dezinfekciju: Sva dezinfekcijska sredstva, Osim dezinfekcije posuđa i havon PERFECT

PARAZITI

Paraziti su životinjska (ili i biljna) živa bića, koji napadnu veći organizam i nanose mu štetu. Kako se kod parazita obično ne radi o mikroorganizmima, dezinfekcijska sredstva nemaju delovanje. Kod napada parazita potrebne su terapijske mere i HAGLEITNER ne nudi antiparazitska sredstva.

Scabies / šuga

Šuga (medicinski Scabies) je svetski rasprostranjena bolest kože kod ljudi. Uzrokuju je krpelji šuge. Ženke veličine 0,3 mm polukuglastog oblika ležu jaja ispod gornje površine kože. Njihovim izlučevinama stvaraju se vezikule, papule, pustule, žuljevi, zglobovi i kore. Za pogodene pacijente na snazi je zabrana već i kod sumnje za boravak i rad u zajednicama.



Krpelj

Vaške

Temene vaške su insekti koji sisaju krv, bez krila i pripadaju porodici vaški koje napadaju ljudi. Ova vrsta obuhvata mnogo podvrsta ali samo dve napadaju ljudi. To su temena i tekstilna vaška. Stidne usi također parazitiraju isključivo kod ljudi. Sve vrste sisaju krv nekoliko puta dnevno i ležu jaja na ljudskim dlakama. Terapija je na hemijskoj osnovi. A za rublje je potrebna termička dezinfekcija.



Vaške

Stenice

Stenice su specijalizirane na život na mestima za spavanje bića slične temperature – posebno ljudi kao i za hranjenje krv istih. Uzrokuju kod većine ljudi svrab duži od jedne sedmice. Protiv stenica se bori sa insekticidima ili termičkim metodama, koje provode stručnjaci. Redovno, najmanje jednom nedeljno menjanje posteljine je efektna metoda prevencije.



stenice

SPISAK PREPORUČENIH POMOĆNIH I SREDSTAVA ZA NEGU.

Priprema za slučaj pojave infektivne bolesti u domovima za negu starijih i bolesnih osoba

- Zaštitni mantil ili / i zaštitna odela (dugih rukava, nepropusnih na tečnost)
- Jednokratne rukavice
- Zaštita usta i nosa (uobičajena i sa FFP 3 filterom)
- Zaštitne mrežice za kožu
- Kanta za smeće – otvaranje nogom
- Guste zatvorene vreće za rublje
- Dezinfekcijska sredstva za kožu i sluzokožu
- Antiseptik za kožu (losion za pranje) za negu korisnika
- Virucidno dezinfekcijsko sredstvo za ruke
- Virucidno dezinfekcijsko sredstvo za površine
- Ploče za označavanje sobe (npr Informišite osoblje prije ulaska) Obratiti pažnju na zaštitu medicinskih podataka
- Jednokratno posuđe i pribor
- Jednokratne krpe za pranje
- Jednokratni ručnici
- Virucidno delujući prašak za pranje rublja



SMERNICE ZA HIGIJENU

Na sledećim stranama ćete pronaći smernice za higijenu kod najčešćih infektivnih bolesti. Ove smernice treba posmatrati samo kao opšte informacije. Za provedbu terapijskih mera je uvek odgovoran klijent ili ustanova za negu.

Standardne osnovne mere higijene

Lična higijena	<ul style="list-style-type: none"> • Vezane duge kose i duge brade • Čisti, kratki i okruglo sećeni nokti • Bez laka za nokte / umetnih noktiju • Bez prstena/ nakita na rukama i podlakticama
Pranje ruku	<ul style="list-style-type: none"> • Kod makroskopskog zaprljanja • Nakon posete WC-u (kod diarrhoe dezinficirati ruke) • Nakon brišanja nosa (kod rinitisa dezinficirati ruke)
Dezinfekcija ruku	<ul style="list-style-type: none"> • Pre i posle pat. kontakta • Pre aseptičkih radnji • Nakon kontakta sa potencijalno infektivnim materijalom • Nakon kontakta sa direktnom Pat. okolinom
Radna odeća	<ul style="list-style-type: none"> • Dnevna promena + • Nakon kontaminacije
Lična zaštitna oprema (jednokratne rukavice, Zaštita za nos i usta, zaštita za oči, zaštitni mantil, jednokratna kecelja)	<ul style="list-style-type: none"> • Kod predvidive kontaminacije • Kod bliskog (<1m) kontakta sa pat. Kroz kapljice prenosivog • Kod promene zavoja velike površine • Za dezinfekciju površina <p>Opseg zaštitne opreme uvek mora biti određen za svaki slučaj.</p>
Površine blizu pacijenata (noćni ormarići, nosila,...)	Najmanje jednom dnevno kao i nakon kontaminacije dezinficirati

Standardne osnovne mere higijene (nastavak)

Kreveti Madraci	Dnevna dezinfekcija brišanjem kao kod promene pacijenata tako i u centralnoj prostoriji (kod boravka >7 dana i infektivno relevantnih dijagnoza)
Jastuci Pokrivači	Mašinska priprema prilikom promene pacijenata kao i kod zaprljanja.
Medicinski proizvod (instrumenti, aparati...)	Jednom dnevno kao i nakon upotrebe/kontaminacije.
Rublje	Direktno odlaganje u vreće za rublje nakon upotrebe/kontaminacije
Posuđe pacijenata	Trenutno odlaganje (kolica s hranom) odnosno dezinficirajuće čišćenje na mestu (mašina za pranje posuđa) nakon upotrebe i u slučaku kontaminacije
Boce za urin Noćne posude	Nakon upotrebe/kontaminacije termički obraditi
Dozatori za sapun, zaštitu kože i dezinfekciju	Dnevna dezinfekcija brišanjem kao i polugodišnja manuelna ili mašinska provedba dezinfekcije
Zastori za tuš Paravani Zavesa	<ul style="list-style-type: none"> • Dnevna dezinfekcija brišanjem + • Mesečno hemijsko-termičko čišćenje + • Hemijsko-termičko čišćenje kod vidljivih zaprljanja
Smeće	Trenutno odlaganje
Zaključna dezinfekcija	Dezinfekcija brišanjem svih površina kod otpuštanja, premeštanja,...
Čajna kuhinja	Dnevno čišćenje kao i kod zaprljanja
Ornamenti Friziideri	Mesečno čišćenje kao i kod zaprljanja
Krpe za suđe	Dnevno menjanje kao i kod zaprljanja
Sunderi za posuđe Sunderaste krpe	Menjanje na svaka 24 sata
Bife za doručak	Dezinfekcija brišanjem nakon završetka i kontaminacije
Posude za pranje	<ul style="list-style-type: none"> • Dezinfekcija brišanjem ili priprema uređaja za čišćenje i dezinfekciju nakon upotrebe i kontaminacije • Prilikom skladištenja obratiti pažnju na potpuno sušenje
Tastature, PC miševi	Dnevna dezinfekcija brišanjem kao i kod kontaminacije



Izvori zaprljanja	
Mali izvori zaprljanja	Veliki izvori zaprljanja
<ul style="list-style-type: none"> • Mašinsko disanje sa zatvorenim izduvnim sistemom • Bez respiratorne infekcije kod kolonizacije nos/ždrela • Male, dobro pokrivene rane • Krvni sistem • Zatvorene drenaže • Zatvoreni odvodni sistemi 	<ul style="list-style-type: none"> • Infekcija u respiratornom traktu sa izbacivanjem sekreta • Nepokrivene, vlažne rane • Urinarna inkontinencija • Dijareja • Nekooperativan pacijent/korisnik

Mere izolacije spadaju u najvažnije higijenske mere za zaštitu pacijenata, stanovnika i osoblja.

Modeli izolacije		
	Pojedinačna izolacija (= Striktna izolacija)	Kontaktna izolacija (= Standardna izolacija)
Soba	<ul style="list-style-type: none"> • Bezuslovno neophodna posebna soba! • Ploča s informacijama za posetioce i osoblje • Vrata držati zatvorenim • Napuštanje sobe samo u posebnim slučajevima • Posebna sanitarna stanica (tuš i toalet) • Zajedničko stanovanje moguće (samo uz dogovor sa higijenskim timom) 	<ul style="list-style-type: none"> • Poželjna posebna soba • Bez zajedničkog smeštaja sa tek operisanim i pacijentima koji bi se lako zarazili.
Higijenska dezinfekcija ruku	<p>Pogledati smernice „higijenske dezinfekcije ruku“ posebno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prilikom ulaska i izlaska iz sobe • Pre i posle direktnog kontakta s pacijentom • Nakon potencijalne i potvrđene kontaminacije • Nakon skidanja jednokratnih rukavica 	<p>Pogledati smernice „higijenske dezinfekcije ruku“ posebno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pre i posle direktnog kontakta s pacijentom • Nakon potencijalne i potvrđene kontaminacije s infektivnim materijalom • Nakon skidanja jednokratnih rukavica

Modeli izolacije (nastavak)		
	Pojedinačna izolacija (= Striktna izolacija)	Kontaktna izolacija (= Standardna izolacija)
Jednokratne rukavice	<ul style="list-style-type: none"> • Prilikom ulaska u sobu • Kod direktnog kontakta sa pacijentom i kod verovatne kontaminacije s infektivnim materijalom • Generalno preporučeno 	<ul style="list-style-type: none"> • Kod direktnog kontakta sa pacijentom i kod verovatne kontaminacije s infektivnim materijalom • Generalno preporučeno
Jednokratni zaštitni mantil (dugih rukava)	<ul style="list-style-type: none"> • Prilikom ulaska u sobu • Kod direktnog kontakta sa pacijentom i kod verovatne kontaminacije s infektivnim materijalom 	<ul style="list-style-type: none"> • Nije neophodno
Jednokratna kecelja	<ul style="list-style-type: none"> • Kod opasnosti propuštanja zaštitne kecelje 	<ul style="list-style-type: none"> • Kod direktnog kontakta sa pacijentom i kod verovatne kontaminacije s infektivnim materijalom
Zaštita usta/nosa	<ul style="list-style-type: none"> • Prilikom ulaska u sobu 	<ul style="list-style-type: none"> • Kod aktivnosti stvaranja aerosola
Zaštitne naočare	<ul style="list-style-type: none"> • Kod aktivnosti stvaranja aerosola 	
Tok rada	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivnosti kod pogodjenog pacijenta planirati na kraju rutine (vizita, promena zavoja...) 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivnosti kod pogodjenog pacijenta planirati na kraju rutine (vizita, promena zavoja...)
Jednokratni materijal (Zavoji, šprice...)	<ul style="list-style-type: none"> • Prostor za pacijente u sobi • Odlaganje otpada u sobi 	
Višekratni predmeti (termometar, stetoskop...)	<ul style="list-style-type: none"> • Upotreba u skladu sa mogućnostima pacijenata • Dezinfekcija nakon upotrebe 	
Medicinski proizvodi (instrumenti, makaze, pincete....)	<ul style="list-style-type: none"> • Nakon upotrebe odmah odvesti do pripreme za dezinfekciju 	
Posteljina, rublje pacijenata (noćne košulje, ručnici, krpe za pranje)	<ul style="list-style-type: none"> • Dnevna promena • Odlaganje bez međuskladištenja ili dodirivanja predmeta u sobi 	



Modeli izolacije (nastavak)		
	Pojedinačna izolacija (= Striktna izolacija)	Kontaktna izolacija (= Standardna izolacija)
Krevet, madrac, plafon, nameštaj	<ul style="list-style-type: none"> Nakon prestanka izolacije Dezinfekcija u centralnoj prostoriji za krevete 	<ul style="list-style-type: none"> Nakon otpuštanja pacijenta Dezinfekcija u centralnoj prostoriji za krevete
Posuđe	<ul style="list-style-type: none"> Standardna priprema Bez međuskladištenja korištenog posuđa izvan sobe 	
Dezinfekcija u toku	<ul style="list-style-type: none"> Dezinfekcija brisanjem 2x dnevno površina blizu pacijenata Po potrebi povećati frekvenciju Ciljana dezinfekcija nakon kontaminacije sa infektivnim materijalom 	
Zaključna dezinfekcija (nakon prestanka izolacije, otpuštanja, premeštanja, smrti pacijenta)	<ul style="list-style-type: none"> Dezinfekcija brisanjem svih površina i predmeta u sobi 	
Smeće/otpad	<ul style="list-style-type: none"> Odlaganje u sobi 	
Sekreti/ ispiljuvci	<ul style="list-style-type: none"> Standardne mere 	
Komunikacija unutar/izvan stanice	<ul style="list-style-type: none"> Informisanje svih uključenih u negu pacijenta o neophodnim merama (posebno lekara, CT i rentgen odeljenja, OP, fizikalne terapije, transportne službe) 	
Posetioci	<ul style="list-style-type: none"> Iste mere kao i za osoblje 	
Transportno osoblje	<ul style="list-style-type: none"> Nošenje jednokratnih rukavica/mantila prilikom direktnog kontakt-a Higijenska dezinfekcija ruku nakon transporta Dezinfekcija brisanjem svih površina koje su bile u kontaktu s pacijentom 	
Transport pacijenta	<ul style="list-style-type: none"> Zaštita usta/nosa za pacijente prilikom napuštanja sobe u slučaju opasnosti aerogenog širenja ili putem kapljica Pogođene lezije gusto prekriti/zamotati 	

Komunikacija prilikom premeštanja

Prilikom premeštanja na drugu stanicu ili odlaska na ambulantni pregled, sledeća stanica mora biti informisana o infekciji i merama izolacije pacijenta!

E. COLI - ESBL

Beta-laktamaze su enzimi koji se pojavljuju kod mnogih vrsta bakterija i mogu poništiti delovanje mnogih antibiotika.

Extended Spektrum beta-Laktamasen (ESBL) se razlikuju po proširenom spektru delovanja od kojih i Cephalosporine 3. Generacija ESBL se često posmatraju kod Escherichias coli i Klebsielle spp ali se mogu pojaviti i kod drugih uzročnika.

Sanacija

Pouzdana sanacija za ove vrste i nakon saznanja nije moguća.

	Escherichia coli ESBL pos.	Klebsiella spp. ESBL pos.
Mali potencijal rasipanja	Standardne mere higijene	Kontaktna izolacija*
Veliki potencijal rasipanja	Standardne mere higijene	Pojedinačna izolacija*

U rizičnom području (stanice intenzivne nege, onkološke stanice)

	Escherichia coli ESBL pos.	Klebsiella spp. ESBL pos.
Mali potencijal rasipanja	Kontaktna izolacija*	Kontaktna izolacija*
Veliki potencijal rasipanja	Kontaktna izolacija*	Pojedinačna izolacija*



MRSA

Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) je već dugo uzrok nosokomijalne infekcije i razlikuje se od ostalih zbog svoje otpornosti na sve beta-Laktam antibiotike. Kakou mnogim slučajevima postoji i otpornost na druge klase supstanci, opcije terapije su jako ograničene. MRSA kolonizira privremeno kožu i sluzokožu bez da iz toga nastane infekcija zbog čega nepoznati prenosioци pomažu njenom širenju. To može posebno u bolnicama izazvati velike probleme.

U poslednje vreme su primetne i naseobine MRSA-e kod mlađih pacijenata koje mogu dovesti do teških invazivnih infekcija. Ove kolonije se označavaju kao „community-associated“ MRSA (caMRSA) i proizvode takozvani Panton-Valentine Leukocidin (PVL), koji je odgovoran za teške infekcije caMRSA-om.

Izolacija

- Kod malog potencijala širenja: Kontaktna izolacija preporučena!

Kohortizacija (zajedničko smeštanje pogodjenih pacijenata/korisnika sa istim statusom klica) kod višestrukog pojavljivanja u jednoj stanicici je moguće (nakon dogovora sa higijenskim timom).

Sanacija

Kod dokazanog statusa prenosioča MRSA-e i/ili infekcije MRSA-om potrebno je provesti sanaciju.

Nos: Mast za nos (alternativa topički antiseptik) 5-7 dana (najmanje 3 dana) 2x dnevno

Usta/ždrelo: oralna aplikacija antiseptika 7 dana

Koža: dnevno antiseptičko pranje uključujući i kosu (npr sa septDES FOAM) 7 dana

Kontrola uspeha sanacije kroz tri brisa u tri uzastopna dana najranije 3 dana prije prestanka mera sanacije.

VRE

Enterokoke su deo fiziološke flore creva kod ljudi i životinja. Otpornost na Glykopeptidantibiotika (Vancomycin) je primećena u Evropi 1987.

Najveću ulogu igra Enterococcus faecium.

Odnedavno se posmatraju i gram pozitivne klice sa smanjenom otpornošću na linecolid. Napred su enterokoke (v.a. Enterococcus faecium). Već su posmatrane klice kombinovane otpornosti na Glykopeptidantibiotika i Linezolid (v.a. E. faecium).

Izolacija

- Kod malog potencijala širenja: Preporučena kontaktna izolacija!
- Kod velikog potencijala širenja: Preporučena pojedinačna izolacija!

Ne spajati pacijente otporne na linecolit sa MRSA pacijentima!

Sanacija

Pozdana sanacija nakon saznanja nije moguća.

CLOSTRIDIUM DIFFICILE

Kako bi se izbeglo daljno širenje C.difficile, neophodne su kontinuirane mere higijene.

Izolacija

Pojedinačna izolacija sa vlastitim toaletom kod pacijenata sa CDAD je neophodna 48 sati nakon prvih simptoma Nakon dogovora sa higijenskim timom je moguće zajedničko smestanje više pacijenata.

Dezinfekcija ruku alkoholom nije dovoljna za klostrinspore tako da je potrebno higijensko pranje ruku nakon dezinfekcije.

Dezinfekcija površina

Dezinfekcija površina potrebna 3x dnevno. Potrebno je obratiti pažnju prilikom korištenja sporocidnih proizvoda.

NOROVIRUS

Kako bi se izbeglo daljno širenje C.difficile, neophodne su kontinuirane mere higijene.

Izolacija

Pojedinačna izolacija sa vlastitim toaletom kod pacijenata sa norovirusom je neophodna 48 sati nakon prvih simptoma. Nakon dogovora sa higijenskim timom je moguće zajedničko smestanje više pacijenata.

Prilikom dezinfekcije ruku alkoholom potrebno je obratiti pažnju na sredstva koja deluju na Noroviruse.

Dezinfekcija površina

Dezinfekcija površina potrebna 3x dnevno. Potrebno je obratiti pažnju na upotrebu proizvoda koje deluju na noroviruse.



INFLUENCA

Kod pozitivnog rezultata se preporučuju dodatne mere higijene:

Izolacija

- Pojedinačna izolacija za celo vreme bolesti.
- Kod istih uzročnika je moguća kohortna izolacija.
- Ukoliko je moguće negu bi trebalo preuzeti vakcinisano osoblje.

TUBERKULOZA

Bolest (aktivna tuberkuloza)

- Otvorena tuberkuloza dišnih organa (Patogeni koji se mogu otkriti u ispljuvaku, izlučivanju traheje, bronhijalnoj sekreciji)
- Zatvorena tuberkuloza dišnih organa (Patogeni koji se ne mogu otkriti u ispljuvaku, izlučivanju traheje, bronhijalnoj sekreciji)
- Extrapulmonalna tuberkuloza npr urogenitalnog, intestinalnog trakta

Infekciovni materijal

Zavisno od lokalizacije bolesti: Ispljuvak, sekret iz bronhija i traheja, želučana kiselina, likvor, urin, stolica, sekret iz rane, genitalni sekret..

Prenos

- Aerogen putem inhalacije aerosolnih čestica koje se oslobođaju prilikom kašla, kijanja, pevanja i pričanja kod pacijenata sa otvorenom plućnom tuberkolozom
- Kontaktni prenos: Inokulacija materijala koji sadrži uzročnike na već postojećoj rani ili ozljede putem kontaminiranih predmeta

Izolacija

Striktna prostorna izolacija u pojedinačnoj sobi je neophodna za pacijente kod sumnje i potvrde infektivne plućne tuberkuloze kao i pacijente sa extrapulmonalnim oblikom tuberkuloze ukoliko postoji opasnost od širenja uzročnika (npr kod nedostatka saradnje).

- Celo vreme izolacije, pacijenti bi trebali ostati u sobi.

- Sobe se trebaju često provetrvati a vrata prema hodniku biti zatvorena. Optimalno bi bilo smeštanje u izoliranu sobu sa RLT uređajem (negativni tlak zraka kao i faktor promene zraka najmanje 6x/h).
- Kod MDR (multi drug resistance) slučaja: stroga izolacija u prostoriji sa RLT uređajem i HEPA filterom.
- Kod kašla i kijanja, pacijent bi trebao držati papirnu maramicu ispred usta i nosa.

Kohortna izolacija je moguća pod određenim uslovima kao npr:

- Kad su bolesti kulturološki potvrđeni kod pacijenata
- Kada su ispitivanja otpornosti identična
- Kada se svi pacijenti odgovarajuće zbrinuti

Obolenje	Izolacija	FFP-maska	Zaštitni mantil	Rukavice
Sumnja na otvorenu Tbc	da	da (pacijent, osoblje, posetioци)	da	da
Dišni putevi - Tbc				
otvoreno	da	da (pacijent, osoblje, posetioци)	da	da
zatvoreno	ne	ne	ne	ne
Extrapulmonale Tbc				
Sekret npr kod Limfni čvorovi - Tbc	eventualno	ne	da (npr prilikom zamene zavoja)	da
Urogenital-Tbc	eventualno	ne	da (npr prilikom zamene zavoja)	da
Inestijalna Tbc	eventualno	ne	eventualno	da
Tbc-Meningitis	ne	ne	ne	Ne


Materijal i otpad koji bi mogao biti kontaminiran infektivnim materijalom se mora tretirati kao infektivni otpad i odlagati u crnim plastičnim vrećama. Stolica i urin u pravilu se mogu odlagati u kanalizaciju.

Objašnjenja pojmova	
Nosokomialna infekcija	Je infekcija koja se javlja kao posledica boravka ili tretmana u bolnici ili njegovateljskom domu. Prije boravka ili tretmana nisu bili prisutni simptomi.
Patogen	Izaziva bolest
MRE: Multirezistentni izazivači	Kada su bakterije neosetljive na mnoge antibiotike. Ne znači da su otporne na dezinfekcijska sredstva.
FFP 3 filtering face piece, maska za zaštitu usta, nosa koja filtrira čestice	FFP3 maske se koriste u kontaktu sa virusima i bakterijama
Zaustavljanje simptoma	Prisutnost simptoma
Crna KAB	Kutija za odlaganje infektivnog otpada
MP Medicinski proizvod	Medicinski proizvod označava stanje ili supstanca koja se koristi kod medicinsko-terapeutskih ili dijagnostičkih svrha za ljudе.
Uredaj za čišćenje i dezinfekciju RDG	Mašine za pranje MP (instrumenti), RDG (također zvan i termodezinfektor) služe za mašinski pripremu medicinskih proizvoda koji se višekratno koriste.
Noša	Uredaj za pripremu čišćenja i termičku pripremu posuda za krevet i boca za urin.
AEMP: Priprema za medicinske proizvode	Ranije ZSVA (centralna sterilizacija)
KBE jedinice koje formiraju koloniju mikroorganizama	Je veličina određivanja

WHO model „**5 indikacija dezinfekcije ruku**“ je razvio za stacionarno bolničko područje. Oslanja se na saznanja kako se klice prenose u bolnicama.

O indikacijama za dezinfekciju ruku izvan stacionarnih bolničkih područja se intenzivno diskutuje među internacionalnim ekspertima.

„Akcija čiste ruke“ je pokrenula zajedno sa WHO prilagodbu WHO modela „5 indikacija dezinfekcije ruku“ za ambulantnu medicinu.



**HAGLEITNER HYGIENE
SRBIJA d.o.o.**
Jozе Laurenčića 14
11283 Beograd-Zemun
Srbija
Tel.: +381 11 4142770
beograd@hagleitner.rs

**HAGLEITNER HYGIENE
BiH d.o.o.**
Ul. Kninska bb
74400 Derventa
Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 53 315 048
Fax: +387 53 315 096
derventa@hagleitner.ba



www.hagleitner.com

O proizvodu - sastav

Proizvoda	Aktivna supstanca	Područja primene
septLIQUID SENSITIVE	2-propanol	Dezinfekcija ruku
septLIQUID PLUS	Etanol, QAV	Dezinfekcija ruku
septDES GEL	Etanol	Dezinfekcija ruku
septDES FOAM	Kvartarna jedinjenja amonijaka	Bezalkoholna dezinfekcija ruku
septDES FOAM SOAP	Kvartarna jedinjenja amonijaka	Higijenski. Pranje ruku
hygienicDES PERFECT	diamin	Dezinfekcija površina + alkalno čišćenje
hygienicDES AC	Mlečna kiselina	Dezinfekcija površina + kiselo čišćenje
hygienic3000	Kvartarna jedinjenja amonijaka	Dezinfekcija površina
hygienicPLUS	Kvartarna jedinjenja amonijaka	Dezinfekcija površina
hygienicDES FORTE	Etanol	Dezinfekcija površina
sanitaryDES 2GO	Mlečna kiselina	Dezinfekcija površina + kiselo čišćenje
hygienicDES 2GO	Kvartarna jedinjenja amonijaka	Dezinfekcija površina
hygienicDES CAPS	In situ ocatna kiselina	Dezinfekcija površina + čišćenje iznenadnih situacija
wcDISINFECT	Kvartarna jedinjenja amonijaka	Dezinfekcija površina, WC daska
hup DISINFECT	Etanol	Dezinfekcija površina, sistem vlažnih krpa
havon T7 (havon professional disinfect)	In situ ocatna kiselina (TAED i Natriumpercarbonat)	Dezinfekcija rublja
havon DES 40	In situ ocatna kiselina (TAED i Natriumpercarbonat)	Dezinfekcija rublja
havon DES 60	In situ ocatna kiselina (TAED i Natriumpercarbonat)	Dezinfekcija rublja
havon PERFECT	In situ ocatna kiselina (TAED i Natriumpercarbonat)	Dezinfekcija rublja
ecosol ECO DES	Vodikov peroksid	Dezinfekcija posuđa
ecosol CLEAN DES	Kloramin T	Dezinfekcija posuđa
ecosol ECO TABS	In situ ocatna kiselina (TAED i Natriumpercarbonat)	Dezinfekcija posuđa